



¿QUÉ HACE?

Previene y corrige desordenes nutricionales ocasionados por deficiencia de Manganeseo.

¿CÓMO LO HACE?

Los ácidos **ECCA Carboxy[®]** de tipo alifáticos contenidos en la formulación, forman quelatos con el Manganeseo de estabilidad intermedia, es decir, lo protege de las barreras de la cutícula y epidermis de la hoja o fruto permitiendo su fácil flujo a través de los tejidos de conducción y eficaz ingreso a las células demandantes.

DOSIS

| GRADO DE DEFICIENCIA DE Mg | DOSIS |
|----------------------------|--------------|
| Leve | 0.5 – 1 L/ha |
| Moderada | 1 – 2 L/ha |
| Severa | 2 – 4 L/ha |

En programa de aplicación preventiva, úsese de 1 a 2 L/ha en las etapas iniciales del desarrollo.

BENEFICIOS

- Evita pérdidas de rendimiento por deficiencias de Manganeseo.
- Previene y Corrige amarillamientos y deformaciones de las hojas por deficiencia de Manganeseo.
- Facilidad de manejo y aplicación.
- Provoca rápida respuesta en los cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

Se aplica por aspersión foliar o al suelo (por sistemas de riego presurizado); puede ser aplicado junto con la mayoría de los fertilizantes y agroquímicos líquidos.

Para preparar la solución de aspersión con agua:

- a) Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad.
- b) Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para predilución o premezcla.
- c) Vierta el contenido de la cubeta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de aspersión.
- d) Agite y complete el total del volumen de aspersión.

Para aplicación al suelo, vierta la cantidad medida en el tanque fertilizador y aplíquelo con el agua de riego.

